INSTRUKCJA UŻYCIA

Krótki przewodnik laboratoryjny

Jedna tabletka. 250 ml świeżego roztworu dekontaminacyjnego.

Jasnoniebieski roztwór ułatwia rozpoznanie zwilżonych miejsc.

DAWKOWANIE	ROZTWÓR	CZAS KONTAKTU
1 tablet / 250 ml	jasnoniebieski	60 s

01 PRZYGOTOWANIE | Cztery proste kroki

01
Wlać 250 ml wody destylowanej do czystego naczynia.

02
Delikatnie rozkruszyć tabletkę w zamkniętym opakowaniu.

03
Otworzyć opakowanie i wsypać cały proszek do wody.

04
Mieszać lub kołysać do całkowitego rozpuszczenia.

02 STOSOWANIE | Spryskiwanie · Wycieranie · Zanurzanie

Spryskać równomiernie. Wycierać czystą ściereczką zwilżoną roztworem.

Zanurzyć: całkowicie pokryć odpowiednie małe elementy.

60 sekund kontaktu · Utrzymywać wilgoć · Następnie wytrzeć

03 SPRAWDZONA ZGODNOŚĆ MATERIAŁOWA

Metale	Stal nierdzewna · srebro · srebro pozłacane
Uszczelki	Silikon · EPDM
Tworzywa	Polipropylen (PP) · probówki PCR · akryl/PMMA
Szkło	Szkło laboratoryjne

Wynik: bez pęknięć naprężeniowych, zmętnienia i oznak zmęczenia materiału.

04 PRZYGOTOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zapisać datę przygotowania. Nie dolewać do starego roztworu.

Po 14 dniach wydłużyć czas kontaktu według oceny eksperymentatora.

Roztwór: biodegradowalny · nietoksyczny · niekorozyjny · bez toksycznych oparów.

Podczas przygotowania nosić okulary i odpowiednie rękawice. Patrz karta SDS.

PYTANIA DOTYCZĄCE UŻYCIA?

Informacje i FAQ: www.dn-x.de