HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rövid útmutató laboratóriumoknak

Egy tabletta. 250 ml friss dekontamináló oldat.

A világoskék oldat láthatóvá teszi a nedves felületeket.

ADAGOLÁS	OLDAT	BEHATÁSI IDŐ
1 tablet / 250 ml	világoskék	60 s

01 ELKÉSZÍTÉS | Négy egyszerű lépés

01
Öntsön 250 ml desztillált vizet egy tiszta edénybe.

02
Óvatosan törje össze a tablettát a zárt csomagban.

03
Nyissa ki a csomagot, és öntse az összes port a vízbe.

04
Keverje a teljes feloldódásig.

02 ALKALMAZÁS | Permetezés · Törlés · Merítés

Permetezés: egyenletesen nedvesítse. Törlés: használjon tiszta, nedves kendőt.

Merítés: a megfelelő kis alkatrészeket teljesen lepje el az oldat.

60 másodperc behatási idő · Tartsa nedvesen · Utána törölje le

03 VIZSGÁLT ANYAGKOMPATIBILITÁS

Fémek	Rozsdamentes acél · ezüst · aranyozott ezüst
Tömítések	Szilikon · EPDM
Műanyagok	Polipropilén (PP) · PCR-csövek · akril/PMMA
Üveg	Laboratóriumi üveg

Eredmény: nem észleltek repedést, homályosodást vagy anyagfáradást.

04 ELKÉSZÍTÉS ÉS BIZTONSÁG

Jegyezze fel az elkészítés dátumát. Ne töltsön utána régi oldatot.

14 napnál régebbi oldatnál a behatási időt a kísérletvezető határozza meg.

Munkaoldat: biológiailag lebomló · nem mérgező · nem korrozív · nincs mérgező gőz.

Viseljen védőszemüveget és megfelelő kesztyűt. Kövesse a biztonsági adatlapot.

KÉRDÉSE VAN?

Információ és GYIK: www.dn-x.de